

Correction du quiz

Sevrage tabagique

Lors d'un repérage de consommation tabagique, quel outil est souvent utilisé pour évaluer la dépendance physique à la nicotine ?

- ☐ Test de Glasgow
- ☒ **Test de Fagerström**
- ☐ Test d'Apgar
- ☐ Test de Goldberg

Quel est le principal composant responsable de l'effet addictif dans une cigarette ?

- ☐ Le monoxyde de carbone
- ☐ Le goudron
- ☒ **La nicotine**
- ☐ L'arsenic

Quels sont les risques principaux du tabac pendant la grossesse ?

- ☒ **Fausse couche**
- ☒ **Retard de croissance intra-utérin**
- ☒ **Prématurité**
- ☐ Anomalies congénitales

Le tabagisme passif chez la femme enceinte expose le fœtus à :

- ☒ **Risque de prématurité**
- ☒ **Risque de petit poids à la naissance**
- ☐ Aucune conséquence
- ☐ Troubles du comportements ultérieurs

Les substituts nicotiniques chez la femme enceinte :

- ☐ Sont contre-indiqués
- ☒ **Peuvent être utilisés sous contrôle médical**
- ☒ **Sont remboursés par la sécurité sociale sur prescription**
- ☐ Sont dangereux pour le fœtus

